

论著·基础研究

doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2021.22.002

网络首发 <https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1097.R.20211029.1801.024.html>(2021-11-01)JNK 信号通路在右美托咪定预处理减轻大鼠离体心肌缺血再灌注损伤中的作用^{*}殷存芝, 陈慧[△], 陈玉姣, 杨在群, 陈亚华
(遵义医科大学附属医院麻醉科, 贵州遵义 563003)

[摘要] **目的** 探讨 JNK 信号通路在右美托咪定(DEX)预处理减轻大鼠离体心肌缺血再灌注损伤(MIRI)中的作用机制。**方法** 将大鼠分为对照(N)组、缺血再灌注(I/R)组、右美托咪定预处理(D)组、JNK 信号通路抑制剂 SP600125(SP)组、右美托咪定与 SP600125(D+SP)组。记录各组大鼠心率(HR)、左心室发展压(LVDP)、左室内压最大上升/下降速率($\pm dp/dt_{max}$)、左心室舒张末压(LVEDP)、心肌梗死面积、心肌细胞凋亡率(AI)情况,电镜观察心肌超微结构变化,Western blot 检测心肌组织 GRP78、JNK、p-JNK 蛋白表达。**结果** 与 N 组相比,其余组 HR、LVDP、 $\pm dp/dt_{max}$ 降低,LVEDP、心肌梗死面积、AI、GRP78、p-JNK、p-JNK/JNK 蛋白表达增加($P < 0.05$);与 I/R 组相比,D 组、SP 组、D+SP 组 HR、LVDP、 $\pm dp/dt_{max}$ 增加,LVEDP、心肌梗死面积、AI、GRP78、p-JNK、p-JNK/JNK 蛋白表达均降低($P < 0.05$)。电镜下 N 组心肌细胞超微结构完整,I/R 组结构严重破坏,D 组、SP 组、D+SP 组破坏较少。**结论** 右美托咪定预处理可能通过抑制 JNK 信号通路,减轻大鼠离体心脏过度的内质网应激及其介导的凋亡,从而减轻 MIRI。

[关键词] 右美托咪定;C-Jun 氨基末端激酶通路;心肌缺血再灌注损伤;内质网应激;凋亡**[中图分类号]** R614 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-8348(2021)22-3786-07Role of C-Jun N-terminal kinases signaling pathway in dexmedetomidine preconditioning in reducing myocardial ischemia-reperfusion injury in isolated rat hearts^{*}YIN Cunzhi, CHEN Hui[△], CHEN Yujiao, YANG Zaiqun, CHEN Yahua
(Department of Anesthesiology, Affiliated Hospital of Zunyi Medical University, Zunyi, Guizhou 563003, China)

[Abstract] **Objective** To investigate the action mechanism of C-Jun N-terminal kinases (JNK) signaling pathway in dexmedetomidine (DEX) preconditioning-induced reduction of myocardial ischemia-reperfusion injury (MIRI) in the isolated rat hearts. **Methods** The rats were divided into the control group (N), ischemia-reperfusion group (I/R), dexmedetomidine preconditioning group (D), JNK signaling pathway inhibitor SP600125 group (SP) and dexmedetomidine + SP600125 group (D+SP). The changes of heart rate (HR), maximum rate of increase of left ventricular pressure ($\pm dp/dt_{max}$), left ventricular developed pressure (LVDP), left ventricular end-diastolic pressure (LVEDP), myocardial infarction size and myocardial cell apoptosis rate (AI) were recorded in each group. The ultrastructural changes of myocardium were observed by electron microscopy. The expressions of GRP78, JNK and p-JNK proteins were detected by Western blot. **Results** Compared with the group N, HR, LVDP and $\pm dp/dt_{max}$ in the other groups were decreased, while LVEDP, myocardial infarct size, AI, GRP78, p-JNK and p-JNK/JNK proteins expressions were increased ($P < 0.05$). Compared with the group I/R, HR, LVDP and $\pm dp/dt_{max}$ in the group D, SP and D+SP were increased, LVEDP, myocardial infarct size, AI, GRP78, p-JNK and p-JNK/JNK proteins expressions were decreased ($P < 0.05$). The ultrastructures of cardiomyocytes under the electronic microscope in the group N were integrity, which in the group I/R were severely damaged, and which in the group D, SP and D+SP had little damage. **Conclusion** Dexmedetomidine preconditioning attenuates MIRI by inhibiting JNK signaling pathway, reducing excessive endoplasmic reticulum stress and its mediated apoptosis.

^{*} 基金项目:贵州省科技计划项目(黔科合基础[2016]1175);遵义市科技计划项目(遵市科合社字[2018]94)。 作者简介:殷存芝(1991—),硕士,主要从事心肌保护方面研究。[△] 通信作者,E-mail:chenhui522524@163.com。

[Key words] dexmedetomidine; C-Jun N-terminal kinase pathway; myocardial reperfusion injury; endoplasmic reticulum stress; apoptosis

恢复心肌的血供是挽救缺血性心脏病的关键治疗措施,但由此产生的心肌缺血再灌注损伤(myocardial ischemia-reperfusion injury, MIRI)却严重影响了患者的治疗及预后。细胞凋亡是 MIRI 的特征之一,抗凋亡成为近年防治 MIRI 的重要措施^[1]。右美托咪定是新型高选择性的 α_2 肾上腺素受体激动剂,有研究表明其预处理可减轻大鼠 MIRI,其机制与抑制细胞凋亡有关^[2]。C-Jun 氨基末端激酶(C-Jun N-terminal kinase, JNK)是丝裂原活化蛋白家族进化上高度保守的一员。研究表明 JNK 信号通路的激活可促进细胞凋亡^[3]。本研究探讨右美托咪定预处理减轻离体大鼠 MIRI 的作用是否与抑制 JNK 信号通路的过度激活从而减轻细胞凋亡有关。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 主要试剂

右美托咪定购自江苏恒瑞医药有限公司;JNK 抑制剂 SP600125、JNK 小鼠抗大鼠单克隆抗体、p-JNK 小鼠抗大鼠单克隆抗体、GAPDH 小鼠抗大鼠单克隆抗体、葡萄糖调节蛋白 78(GRP78)小鼠抗大鼠单克隆抗体、Goat 荧光二抗购自美国 Selleck 公司;TTC 购自北京百奥思科生物技术有限公司;原位细胞凋亡试剂盒购自美国 Sigma 公司。

1.1.2 动物

SPF 级健康雄性 SD 大鼠 60 只,8~10 周,260~280 g,由重庆腾鑫生物技术有限公司提供,动物许可证编号:SCXK(湘)2014-0011。

1.2 方法

1.2.1 模型制备及分组

腹腔注射 1%的戊巴比妥钠 50 mg/kg 麻醉大鼠后充分暴露心脏,迅速剪下并放置于 95% O_2 及 5% CO_2 预充并冷冻的 4 °C K-H 液中,轻轻挤压心脏排除瘀血。迅速悬挂并固定于 Langendorff 装置上,进行 K-H 液灌注,同时置入乳胶水囊至左心室,使左室舒张末期压力维持在 4~7 mm Hg,移动保温杯使心脏处于恒温系统中。每只心脏平衡 15 min 后,对照组(N 组)持续灌注 190 min;缺血再灌注损伤(I/R)组持续灌注 30 min 后,停止灌注 40 min,复灌 120 min;右美托咪定预处理(D)组灌注含有右美托咪定(10 nmol/L)的 K-H 液 30 min, JNK 抑制剂 SP600125 (SP)组灌注含有 SP600125(10 μ mol/L)的 K-H 液 30 min,右美托咪定与 SP600125 混合处理(D+SP)组灌注含右美托咪定(10 nmol/L)和 SP600125(10 μ mol/L)的 K-H 液 30 min,之后处理均同 I/R 组。

1.2.2 大鼠心功能检测

各组分别于平衡末(T_1)、缺血前(T_2)、再灌注末(T_3)3 个时点记录心率(heart rate, HR)、左心室发展压(left ventricular developed pressure, LVDP)、左心室舒张末压(left ventricular end-diastolic pressure, LVEDP)、左室内压最大上升/下降速率(maximum rate of increase of left ventricular pressure, $\pm dp/dt_{max}$)。

1.2.3 TTC 检测心肌梗死面积

再灌注末取下心脏后置于一 80 °C 冰箱冰冻数分钟后取出,将心脏沿心尖至心底以横切面切成厚薄一致的 5 块环形切片,放置于盛有 1% TTC 染液的无菌器皿内,避光、恒温孵育后置于 10% 的甲醛内固定 24 h。将心脏进行拍照,并在 Image Pro 软件下计算梗死面积。

1.2.4 TUNEL 检测心肌细胞凋亡率(AI)

再灌注末切取左心室心肌体积约 1 mm³ 的组织块,制成冰冻切片,按照试剂盒说明书操作,将切片置于荧光显微镜下观察并拍照。每个标本观察 5 张切片,每张切片选取 5 个视野于高倍显微镜下观察, $AI = (\text{绿色荧光染色细胞核数} / \text{总的细胞核数}) \times 100\%$ 。

1.2.5 电镜观察心肌超微结构

留取再灌注末左心室心肌体积约 1 mm³ 的标本,放置于 4% 戊二醛内固定,0.1 mol/L 二甲胍酸钠缓冲液漂洗,1% 锇酸固定,乙醇脱水,环氧树脂进行包埋、聚合,制作超薄切片并染色,透射电镜下观察、拍照。

1.2.6 Western blot 检测心肌组织 GRP78、p-JNK、JNK 蛋白表达

取左心室心肌组织,BCA 法测定蛋白浓度,制备 SDS-PAGE 凝胶,样品进行电泳分离,转膜,封闭,分别加入 GRP78、JNK、p-JNK 的一抗稀释液,4 °C 孵育过夜,加入山羊抗兔荧光二抗,使用化学发光成像系统分析,以目标蛋白条带荧光强度值与内参蛋白条带荧光强度值的比值反映蛋白表达水平。

1.3 统计学处理

采用 SPSS17.0 统计软件进行分析。计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,多组间比较采用单因素方差分析或重复测量方差分析,组间两两比较采用 LSD-*t* 法,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组大鼠心功能的变化

在 T_3 时点,与 N 组比较,其余组 HR、LVDP、 $\pm dp/dt_{max}$ 下降,LVEDP 增加($P < 0.05$);与 I/R 组比

较,D 组、SP 组、D+SP 组 HR、LVDP、 $\pm dp/dt_{max}$ 增加,LVEDP 下降($P<0.05$);D 组、SP 组、D+SP 组在各项心功能指标上无明显差异($P>0.05$),见表 1。

2.2 各组大鼠心肌梗死面积比较

与 N 组比较,其余组再灌注末心肌梗死面积均增加($P<0.05$);与 I/R 组比较,D 组、SP 组、D+SP 组心肌梗死面积均降低($P<0.05$);D 组、SP 组、D+SP 组变化不明显($P>0.05$),见表 2、图 1。


2.3 各组大鼠心肌细胞 AI 比较

与 N 组比较,其余组心肌细胞 AI 增加($P<0.05$);与 I/R 组比较,D 组、SP 组、D+SP 组心肌细

胞 AI 降低($P<0.05$);与 D 组比较,SP 组 AI 增加($P<0.05$);与 SP 组比较,D+SP 组心肌细胞 AI 降低($P<0.05$),见表 2、图 2。

2.4 各组大鼠超微结构改变

N 组心肌细胞超微结构基本完整,结构清楚,未见明显凋亡小体;I/R 组心肌细胞出现明显损伤,细胞破碎严重,明显可见凋亡小体,肌原纤维丝排列紊乱并局部出现断裂;D 组、SP 组、D+SP 组:心肌细胞形态基本完整,少量细胞核破坏,线粒体聚集呈轻微肿胀,部分线粒体脊消失,局部发现空泡,偶见凋亡小体,见图 3。



白色:梗死区域;红色:正常区域。

图 1 各组大鼠心肌梗死面积图


表 1 各组大鼠不同时点心功能指标比较($\bar{x}\pm s$)

指标		T ₁	T ₂	T ₃
HR(次/分钟)	N 组	310.29±10.49	297.22±9.38	292.06±10.42
	I/R 组	305.08±11.52	287.10±7.55	153.80±8.06 ^{ac}
	D 组	321.06±12.88	293.67±12.70	205.46±6.57 ^{abc}
	SP 组	315.54±10.11	291.23±9.46	216.22±8.83 ^{abc}
	D+SP 组	302.36±9.87	288.96±9.73	198.35±7.38 ^{abc}

续表 1 各组大鼠不同时间点心功能指标比较($\bar{x} \pm s$)

指标		T ₁	T ₂	T ₃
LVDP(mm Hg)	N 组	97.32±5.43	85.87±2.97	68.35±4.16 ^c
	I/R 组	95.67±6.15	86.42±2.44	16.94±3.18 ^{ac}
	D 组	101.03±7.78	89.16±2.85	35.33±6.11 ^{abc}
	SP 组	98.10±5.01	88.14±2.20	39.37±4.22 ^{abc}
	D+SP 组	97.31±6.54	87.87±2.43	37.53±4.78 ^{abc}
LVEDP(mm Hg)	N 组	5.33±1.28	7.85±0.83	16.66±0.96 ^c
	I/R 组	4.97±0.82	6.43±0.75	47.48±2.73 ^{ac}
	D 组	5.33±1.08	7.15±0.75	30.45±1.99 ^{abc}
	SP 组	5.63±0.75	7.42±1.23	30.09±2.18 ^{abc}
	D+SP 组	5.60±0.97	6.12±0.73	31.29±2.16 ^{abc}
+dp/dtmax(mm Hg/s)	N 组	3 187.86±169.47	3 084.01±59.43	2 306.81±129.48 ^c
	I/R 组	2 974.90±127.09	2 858.43±95.50	724.93±38.70 ^{ac}
	D 组	3 253.43±232.49	3 090.50±56.96	1 662.09±102.37 ^{abc}
	SP 组	3 130.75±230.25	2 938.16±78.77	1 735.21±97.70 ^{abc}
	D+SP 组	3 031.10±181.50	2 900.53±74.94	1 796.18±126.57 ^{abc}
-dp/dtmax(mm Hg/s)	N 组	1 225.77±93.14	1 221.22±79.59	921.72±65.46 ^c
	I/R 组	1 169.18±63.95	1 243.74±58.40	379.70±27.27 ^{ac}
	D 组	1 213.78±85.38	1 217.05±79.69	828.39±37.70 ^{abc}
	SP 组	1 270.73±104.03	1 152.44±75.15	842.14±45.80 ^{abc}
	D+SP 组	1 178.66±89.92	1 201.64±86.44	820.07±32.85 ^{abc}

^a: $P<0.05$,与 N 组比较;^b: $P<0.05$,与 I/R 组比较;^c: $P<0.05$,与 T₁ 时点比较。



蓝色:正常细胞核;绿色荧光:凋亡细胞核。


图 2 各组大鼠心肌细胞凋亡情况($\times 400$)

2.5 各组大鼠 GRP78、p-JNK1/JNK1、p-JNK2/JNK2 蛋白表达比较

与 N 组比较,其余组 GRP78、p-JNK1/JNK1、p-JNK2/JNK2 蛋白表达增加($P<0.05$)。与 I/R 组比较,其余组 GRP78、p-JNK1/JNK1、p-JNK2/JNK2 蛋

白表达降低($P<0.05$)。与 D 组比较,SP 组 GRP78、p-JNK1/JNK1、p-JNK2/JNK2 蛋白表达无明显差异($P>0.05$),D+SP 组 GRP78、p-JNK1/JNK1、p-JNK2/JNK2 蛋白表达降低($P<0.05$)。与 SP 组比较,D+SP 组 GRP78、p-JNK1/JNK1、p-JNK2/JNK2

蛋白表达降低($P<0.05$),见图 4~6。



黑色:细胞核出现核固缩现象;红褐色:线粒体肿胀扩张脊消失,局部线粒体聚集;蓝色:肌源纤维断裂,排列紊乱;紫色:自噬体;标尺:5 μm 。

图 3 细胞透射电镜下各组大鼠心肌细胞超微结构





图 4 各组大鼠 GRP78、JNK、p-JNK 蛋白印迹图



^a: $P<0.05$,与 N 组比较;^b: $P<0.05$,与 I/R 组比较;^c: $P<0.05$,与 D 组比较;^d: $P<0.05$,与 SP 组比较。

图 5 各组 GRP78 蛋白表达比较


表 2 各组大鼠心肌梗死面积与 AI 的比较($\bar{x}\pm s$)

组别	心肌梗死面积(%)	AI(%)
N 组	3.11 $\pm$ 2.02	3.10 $\pm$ 2.02
I/R 组	66.76 $\pm$ 3.98 ^a	66.11 $\pm$ 3.12 ^a

续表 2 各组大鼠心肌梗死面积与 AI 的比较($\bar{x}\pm s$)

组别	心肌梗死面积(%)	AI(%)
D 组	18.02 $\pm$ 5.41 ^{ab}	14.57 $\pm$ 2.75 ^{ab}
SP 组	17.65 $\pm$ 2.89 ^{ab}	20.50 $\pm$ 6.55 ^{abc}
D+SP 组	14.57 $\pm$ 2.75 ^{ab}	12.44 $\pm$ 1.54 ^{abd}

^a: $P<0.05$,与 N 组比较;^b: $P<0.05$,与 I/R 组比较;^c: $P<0.05$,与 D 组比较;^d: $P<0.05$,与 SP 组比较。



^a: $P<0.05$,与 N 组比较;^b: $P<0.05$,与 I/R 组比较;^c: $P<0.05$,与 D 组比较;^d: $P<0.05$,与 SP 组比较。

图 6 各组 p-JNK/JNK 蛋白表达比较

3 讨 论

右美托咪定是一种高选择性 α_2 肾上腺素受体激动剂,由于 α_2 受体广泛分布于心血管、中枢和外周系统及血小板,因此具有广泛的生物学效应。右美托咪

定不仅是一种良好的镇静剂,而且对于接受手术的高危心血管患者具有巨大的潜在保护效力^[4]。大量研究表明右美托咪定对多种脏器均有良好的保护效应^[5-6]。REN 等^[7]报道,右美托咪定可以减少缺血心肌无复流面积,改善心功能,减轻 MIRI。胡杰等^[8]研究表明,右美托咪定可以保护体外循环下冠脉旁路移植术患者的心肺功能。ZHANG 等^[9]报道,右美托咪定可以通过上调 SIRT1/mTOR 轴,减少心肌细胞凋亡、氧化应激及炎症反应、过度的心肌细胞自噬,减轻 MIRI。本实验结果显示:与 N 组比较,I/R 组大鼠心功能明显降低,心肌梗死面积与 AI 明显增加,心肌超微结构破坏严重,表明 MIRI 模型复制成功。而给予右美托咪定预处理后,大鼠心功能指标明显改善,心肌梗死面积与 AI 明显降低,电镜所示的超微结构也显示心肌结构破坏大大减轻,这些均可表明右美托咪定的确具有明显的抗 MIRI 作用。

MIRI 是治疗多种心血管疾病过程中遭受的共同病理生理过程。在众多的诱发因素中,细胞凋亡是其中的原因和特征之一。抑制凋亡对于防止 MIRI 意义重大。CHANG 等^[10]报道,右美托咪定预处理可以通过激活 PI3K/AKT 信号通路发挥抗凋亡作用,从而减轻 MIRI。YUAN 等^[11]研究发现,右美托咪定可通过调控 FKBP12.6/RyR2 信号通路减轻 H9C2 心肌细胞缺氧复氧诱导的细胞内钙超载与细胞凋亡。除了经典的线粒体途径与死亡受体介导的凋亡途径之外,内质网及介导的内质网应激(endoplasmic reticulum stress,ERS)途径成为近年凋亡研究的热点。MIRI 时引起的缺血缺氧及钙超载等会使内质网稳态失衡、功能紊乱,从而形成 ERS。适度的 ERS 可通过处理异常蛋白等恢复内环境稳态,但持久或过度的 ERS 会通过活化相关因子及途径诱发细胞凋亡^[12],给机体带来不利影响。GRP78 是 ERS 的分子伴侣蛋白,当细胞受到外界刺激(缺氧、应激等)发生 ERS 时,细胞内会产生大量未折叠蛋白与错误折叠蛋白,GRP78 也会相应大量增加并与错误折叠蛋白结合,维持内环境稳定。因此,GRP78 表达的急速增加被认为是 ERS 最敏感的标志物^[13]。本实验结果显示:与 N 组相比,I/R 组 GRP78 蛋白表达明显增加;与 I/R 组比较,D 组 GRP78 蛋白表达明显降低。说明缺血再灌注诱发心肌组织出现严重的 ERS,而使用右美托咪定预处理后,ERS 反应明显减轻。

作为 MAPK 家族三大成员之一,JNK 受细胞因子和各种应激的暴露而激活,被激活的 JNK 转移至细胞核内,使底物 C-Jun 磷酸化,大量活化的 C-Jun 可诱导细胞凋亡反应^[14]。JNK 可通过导致凋亡的多条途径诱导细胞发生凋亡,其中主要是通过 IRE1-

TRAF2-ASK1-JNK 通路参与到 ERS 介入的 I/R 的细胞凋亡过程,是缺血再灌注损伤与 ERS 之间重要的交叉通路。有研究报道,布托啡诺预处理可以明显降低 I/R 组心肌组织 JNK 磷酸化水平,抑制 JNK/NF- κ B 信号活化、心肌细胞凋亡,从而减轻 MIRI^[15]。本研究结果显示,心肌缺血再灌注后 JNK 的活化形式 p-JNK 明显升高,提示 JNK 通路参与了缺血再灌注对心肌的损伤。与 I/R 组相比,SP 组的大鼠 JNK 蛋白表达、心肌梗死面积及 AI 明显降低,说明通过抑制 JNK 通路可以明显减少大鼠 MIRI 及细胞凋亡。而右美托咪定预处理对 MIRI 的保护作用中存在 JNK 水平的变化,结合右美托咪定预处理可以降低 ERS 标志物 GRP78 的表达,推测右美托咪定可通过某种作用下调 JNK 蛋白表达并抑制其活化,抑制过度的 ERS,从而对 JNK 调控的细胞凋亡产生抑制作用。

综上所述,右美托咪定预处理可以有效减轻大鼠离体心脏 MIRI,且这种保护作用可能是通过抑制 JNK 信号通路的激活,从而减轻过度 ERS 及其介导的凋亡。

参考文献

- [1] HUANG L H,LI J,GU J P,et al. Butorphanol attenuates myocardial ischemia reperfusion injury through inhibiting mitochondria-mediated apoptosis in mice[J]. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*,2018,22:1819-1824.
- [2] PENG K,CHEN W R,XIA F,et al. Dexmedetomidine post-treatment attenuates cardiac ischaemia/reperfusion injury by inhibiting apoptosis through HIF-1 α signalling[J]. *J Cell Mol Med*,2020,24(1):850-861.
- [3] DAVIS R J. Signal transduction by the JNK group of MAP kinases[J]. *Cell*,2000,103:239-252.
- [4] WANG H,ZHANG S,XU S,et al. The efficacy and mechanism of dexmedetomidine in myocardial apoptosis via the renin-angiotensin-aldosterone system[J]. *J Renin Angiotensin Aldosterone Syst*,2015,16(4):1274-1280.
- [5] LIANG S,WANG Y,LIU Y. Dexmedetomidine alleviates lung ischemia-reperfusion injury in rats by activating PI3K/Akt pathway[J]. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*,2019,23(1):370-377.
- [6] 黄以庭,罗慧,冯雅微,等. 右美托咪定对肝癌患

- 者围术期细胞免疫功能的影响[J]. 实用医学杂志, 2017, 33(12): 2016-2018.
- [7] REN J, LI C, LIU Y, et al. Protective effect of dexmedetomidine against myocardial ischemia-reperfusion injury in rabbits[J]. Acta Cir Bras, 2018, 33(1): 22-30.
- [8] 胡杰, 苏新娟, 郑海涛, 等. 右美托咪定对体外循环下冠脉旁路移植术患者心肺功能的影响[J]. 实用医学杂志, 2017, 33(9): 1532-1533.
- [9] ZHANG X, LI Y, WANG Y, et al. Dexmedetomidine postconditioning suppresses myocardial ischemia/reperfusion injury by activating the SIRT1/mTOR axis [J]. Biosci Rep, 2020, 40(5): BSR20194030.
- [10] CHANG J H, JIN M M, LIU J T. Dexmedetomidine pretreatment protects the heart against apoptosis in ischemia/reperfusion injury in diabetic rats by activating PI3K/Akt signaling in vivo and in vitro [J]. Biomed Pharmacother, 2020, 127: 110188.
- [11] YUAN M, MENG X W, MA J, et al. Dexmedetomidine protects H9c2 cardiomyocytes against oxygen-glucose deprivation/reoxygenation-induced intracellular calcium overload and apoptosis through regulating FKBP12. 6/RyR2 signaling [J]. Drug Des Devel Ther, 2019, 13: 3137-3149.
- [12] PLUQUET O, POURTIER A, ABBADIE C. The unfolded protein response and cellular senescence. A review in the theme: cellular mechanisms of endoplasmic reticulum stress signaling in health and disease [J]. Am J Physiol Cell Physiol, 2015, 308: 415-425.
- [13] POBRE K F R, POET G J, HENDERSHOT L M. The endoplasmic reticulum (ER) chaperone BiP is a master regulator of ER functions: getting by with a little help from ERdj friends [J]. J Biol Chem, 2019, 294: 2098-2108.
- [14] SEKINE Y, TAKEDA K, ICHIJO H. The ASK1-MAP kinase signaling in ER stress and neurodegenerative diseases [J]. Curr Mol Med, 2006, 6(1): 87-97.
- [15] 刘锦源, 司林杰. 酒石酸布托啡诺预处理对小鼠心肌缺血再灌注损伤的保护作用及其机制 [J]. 东南大学学报(医学版), 2017, 36(1): 74-77.
- (收稿日期: 2021-02-10 修回日期: 2021-08-13)
-
- (上接第 3785 页)
- 抗的相关性分析[J]. 检验医学与临床, 2019, 16(7): 939-942.
- [18] 阿地力江·萨吾提, 周文婷, 艾尼瓦尔·吾买尔. 糖原合成激酶-3 在氧化应激与阿尔茨海默病中的作用[J]. 西北药学杂志, 2019, 34(6): 838-844.
- [19] 夏佳蕊, 刘佳琪, 李宗高, 等. 铝神经毒性作用机制研究进展[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(13): 3276-3280.
- [20] JAEGER L B, DOHGU S, SULTANA R, et al. Lipopolysaccharide alters the blood-brain barrier transport of amyloid beta protein: a mechanism for inflammation in the progression of Alzheimer's disease [J]. Brain Behav Immun, 2009, 23(4): 507-517.
- [21] SHATI A A, ELSAID F G, HAFEZ E E. Biochemical and molecular aspects of aluminium chloride-induced neurotoxicity in mice and the protective role of Crocus sativus L. extraction and honey syrup [J]. Neuroence, 2011, 175(1): 66-74.
- [22] 李宁, 赵紫薇, 张凡, 等. 叶酸对铅暴露大鼠肝脏氧化损伤的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(11): 5179-5184.
- [23] 曲秋莲, 张英鸽. 3 种纳米颗粒对 BGC-823 细胞线粒体膜电位及细胞内活性氧水平的影响[J]. 军事医学, 2010, 34(4): 306-308.
- (收稿日期: 2021-03-16 修回日期: 2021-07-21)